

Protocole de dilution catécholamines

- **NORADRENALINE** : 1 ampoule de 4 ml contient 4 mg de produit actif (Noradrénaline) pour 8 mg de L Bitartrate de Noradrénaline

Rapport poids du patient / quantité de TARTRATE de NORADRENALINE

40 Kg	Prendre 12 ml que l'on ramène à 50 ml	100 kg	Prendre 30 ml que l'on ramène à 50 ml
50 Kg	Prendre 15 ml que l'on ramène à 50 ml	110 kg	Prendre 33 ml que l'on ramène à 50 ml
60 Kg	Prendre 18 ml que l'on ramène à 50 ml	120 kg	Prendre 36 ml que l'on ramène à 50 ml
70 Kg	Prendre 21 ml que l'on ramène à 50 ml	130 kg	Prendre 39 ml que l'on ramène à 50 ml
80 Kg	Prendre 24 ml que l'on ramène à 50 ml	140 kg	Prendre 42 ml que l'on ramène à 50 ml
90 kg	Prendre 27 ml que l'on ramène à 50 ml	150 kg	Prendre 45 ml que l'on ramène à 50 ml

➔ Avec les dilutions ci-dessus, un affichage de 1 ml/h sur la SAP correspond à un débit effectif de 0,1 µg/kg/mn

Réalisation : Réanimation Polyvalente, CHU Nice, Hôpital Pasteur 2

FD, SLM, BR, CS, RN

Mise à jour le 07/09/2022 Par Dr D.DOYEN, Dr A.ROBERT et Mr F.BILGER

Service de Médecine Intensive Réanimation / UF 4009, CHU Nice, Hôpital Pasteur 2

Service de Médecine Intensive Réanimation / UF 7620, CHU Nice, Hôpital l'Archet 1

Chef de service : Pr J.DELLAMONICA

Responsables d'UF : Dr D.DOYEN et Dr H.HYVERNAT

