

PROPOFOL (DIPRIVAN® 10mg/ml)

Objectif principal : Utiliser la posologie la plus adaptée aux besoins du patient en fonction de l'objectif RASS (Richmond Agitation & Sédation Score) fixé par le corps médical. Cette posologie doit être adaptée à chaque tour paramédical en fonction des résultats du score.

Méthodologie : Adaptation de la posologie du traitement en fonction du RASS du patient.

<i>Posologie en mg/kg/h</i>	50 kg	60 kg	70 kg	80 kg	90 kg	100 kg	
3.5 mg /kg /h	175 mg / h	210 mg / h	245 mg / h	280 mg / h	315 mg / h	350 mg / h	
3 mg /kg /h	150 mg / h	180 mg /h	210 mg / h	240 mg / h	270 mg / h	300 mg / h	
2.5 mg /kg /h	125 mg / h	150 mg / h	175 mg / h	200 mg / h	235 mg / h	250 mg / h	
2 mg /kg /h	100 mg / h	120 mg / h	140 mg / h	160 mg / h	180 mg / h	200 mg / h	
1.5 mg /kg /h	75 mg / h	90 mg / h	105 mg / h	120 mg / h	135 mg / h	150 mg / h	DOSE DE DEPART
1 mg /kg /h	50 mg / h	60 mg / h	70 mg / h	80 mg / h	90 mg / h	100 mg / h	
0.5 mg /kg /h	25 mg / h	30 mg / h	35 mg / h	40 mg / h	45 mg / h	50 mg / h	

